

ANALIZATORUL ACUSTICO-VESTIBULAR

1. În urechea internă sunt situați receptorii:

- a. analizatorului acustic;
- b. analizatorului kinestezic;
- c. analizatorului vestibular;
- d. pentru poziția corpului în repaus,
- e. pentru poziția corpului în mișcare.

2. Analizatorul vestibular monitorizează:

- a. echilibrul static;
- b. accelerația liniară;
- c. echilibrul dinamic;
- d. frecvența sunetelor.
- e. poziția și mișcarea corpului în spațiu.

3. Nervul acustic:

- a. se mai numește și cohlear;
- b. deservește analizatorul kinestezic;
- c. are plasat pe traiectul său ganglionul spiral Corti;
- d. are plasat pe traiectul său ganglionul Scarpa
- e. reprezintă perechea a VIII-a de nervi cranieni.

4. Nervul vestibular:

- a. deservește analizatorul vestibular;
- b. se mai cheamă și cohlear;
- c. are plasat pe traiectul său ganglionul Scarpa;
- d. deservește analizatorul acustic.
- e. reprezintă perechea a VIII-a de nervi cranieni.

5. Nervul vestibulo-cohlear:

- a. formează perechea a VII-a de nervi cranieni;
- b. se mai cheamă și acustico-vestibular;
- c. este format din unirea nervului auditiv cu cel cohlear;
- d. pătrunde în trunchiul cerebral prin șanțul ponto-peduncular;
- e. pătrunde în trunchiul cerebral prin șanțul bulbo-pontin;

6. Prin receptorii săi, urechea umană contribuie la:

- a. recepția undelor sonore;
- b. redresarea posturală;
- c. menținerea echilibrului;
- d. orientarea în timp.
- e. orientarea în spațiu.

7. Urechea umană percepe:

- a. sunete;
- b. substanțe volatile;
- c. unde sonore repetate într-o anumită ordine;
- d. cuante de lumină.
- e. unde sonore ce se succed neregulat.

8. Analizatorul vestibular furnizează informații asupra:

- a. poziției corpului în spațiu;
- b. mișcărilor corpului în spațiu;
- c. postura corpului;
- d. frecvenței undelor sonore.
- e. amplitudinii undelor sonore.

9. Analizatorul vestibular:

- a. poate declanșa reacțiile de redresare posturală;
- b. furnizează informații asupra rotirii capului;
- c. furnizează informații asupra poziției corpului în spațiu;

- d. furnizează informații numai asupra accelerației liniare
- e. furnizează informații numai asupra accelerației circulare

10. La redresarea posturală alături de analizatorul vestibular mai participă și informațiile de la:

- a. receptorii cutanați pentru tact;
- b. celulele cu con și bastonaș;
- c. fusurile neuromusculare;
- d. analizatorul olfactiv;
- e. receptorii cutanați pentru presiune.

11. Urechea externă include:

- a. pavilionul;
- b. casa timpanului;
- c. conductul auditiv extern;
- d. melcul osos.
- e. labirintul osos

12. Urechea medie:

- a. conține un lanț articulat de oscioare;
- b. este săpată în solzul temporalului;
- c. prezintă membrana timpanică spre exterior;
- d. include conductul auditiv extern.
- e. este o cavitate pneumatică săpată în stânca sfenoidului.

13. Peretele medial al urechii medii prezintă:

- a. timpanul;
- b. fereastra ovală;
- c. canalele semicirculare osoase;
- d. fereastra rotundă.
- e. trompa lui Eustachio.

14. Peretele anterior al urechii medii prezintă:

- a. timpanul;
- b. fereastra ovală;
- c. comunicarea cu nazofaringele;
- d. fereastra rotundă.
- e. trompa lui Eustachio.

15. Trompa lui Eustachio asigură:

- a. comunicarea urechii interne cu nazofaringele;
- b. comunicarea faringelui cu urechea medie;
- c. egalizarea presiunilor la nivelul ferestrei rotunde;
- d. comunicarea faringelui cu casa timpanului.
- e. egalizarea presiunii pe ambele fețe ale timpanului.

16. Lanțul de oscioare al urechii medii include, în ordine:

- a. nicovala și ciocanul;
- b. ciocanul și nicovala;
- c. ciocanul și scărița;
- d. nicovala și scărița.
- e. scărița și nicovala.

17. La nivelul lanțului de oscioare al urechii medii:

- a. vibrațiile sonore sunt amplificate;
- b. vibrațiile sonore sunt transmise membranei ferestrei rotunde;
- c. vibrațiile sonore sunt atenuate;
- d. vibrațiile sonore sunt blocate;
- e. se reglează intensitatea undelor sonore.

18. Despre lanțul de oscioare al urechii medii putem afirma următoarele:

- a. fiecare oscior are un mușchi propriu;
- b. mușchiul ciocanului diminuează vibrațiile sonore puternice;
- c. mușchiul scăriței amplifică vibrațiile sonore slabe;

- d. mușchiul nicovalei diminuează vibrațiile sonore puternice;
- e. există un mușchi comun pentru toate cele trei oscioare.

19. Labirintul osos:

- a. este săpat în stânca parietalului;
- b. adăpostește labirintul membranos;
- c. este săpat în solzul temporalului;
- d. se mai cheamă și ureche internă;
- e. se mai cheamă și casa timpanului.

20. În interiorul labirintului osos se găsește:

- a. labirintul membranos;
- b. un lanț articulat de trei oscioare;
- c. perilimfă;
- d. timpanul;
- e. un sistem de camere membranoase.

21. Labirintul osos este format din:

- a. vestibul;
- b. columelă;
- c. canale semicirculare;
- d. saculă;
- e. melc.

22. Melcul osos:

- a. se mai numește și cohlee;
- b. face parte din urechea internă;
- c. include utricula și sacula;
- d. este un canal de formă conică, răsucit în jurul unui ax central;
- e. prezintă un ax central numit columelă.

23. Despre columelă putem afirma următoarele:

- a. pe ea se prinde lama osoasă spirală;
- b. este axul central al melcului osos;
- c. este situată în interiorul melcului membranos;
- d. participă la delimitarea canalului cohlear;
- e. pe ea se prinde membrana vestibulară.

24. Lama osoasă spirală vine în contact cu:

- a. cohleea;
- b. columela;
- c. utricula;
- d. membrana bazilară;
- e. membrana vestibulară Reissner.

25. Lumenul canalului spiral al melcului osos este compartimentat în:

- a. rampa timpanică;
- b. canalul cohlear;
- c. rampa vestibulară;
- d. membrana bazilară;
- e. casa timpanului.

26. Helicotrema este plasată:

- a. spre vârful melcului osos;
- b. în utriculă;
- c. în saculă;
- d. între rampele din canalul spiral;
- e. spre baza melcului osos.

27. Labirintul membranos conține:

- a. utricula;
- b. canalele semicirculare membranoase;
- c. sacula;

- d. helicotrema;
- e. un sistem de camere situate în labirintul osos.

28. Canalul cohlear este delimitat de:

- a. membrana bazilară;
- b. peretele lateral al melcului osos;
- c. membrana vestibulară Reissner;
- d. lama osoasă spirală;
- e. membrana timpanului.

29. La nivelul urechii interne, rampa timpanică:

- a. este situată sub membrana bazilară;
- b. comunică prin helicotremă cu rampa vestibulară;
- c. conține perilimfă;
- d. comunică cu canalul cohlear;
- e. este delimitată de membrana reticulată.

30. La nivelul urechii interne, rampa vestibulară:

- a. este situată deasupra membranei vestibulare Reissner;
- b. comunică prin helicotremă cu rampa timpanică;
- c. conține perilimfă;
- d. este delimitată de membrana tectoria;
- e. comunică cu vestibulul.

31. Cili celulelor auditive vin în contact cu:

- a. membrana otolitică;
- b. membrana reticulată;
- c. membrana bazilară;
- d. membrana tectoria.
- e. membrana Reissner.

32. Canalul cohlear:

- a. este situat în melcul osos;
- b. conține endolimfă;
- c. conține segmentul receptor al analizatorului vestibular;
- d. este format din două cavități: utricula și sacula;
- e. conține ganglionul vestibular Scarpa.

33. Organul Corti:

- a. este situat în canalul cohlear;
- b. este așezat pe membrana bazilară;
- c. conține receptorii auditivi;
- d. conține receptorii vestibulari;
- e. comunică cu rampa vestibulară.

34. Receptorii vestibulari sunt situați în:

- a. labirintul membranos;
- b. melcul mebranos;
- c. utriculă;
- d. columelă;
- e. organul Corti.

35. Receptorii vestibulari sunt situați în:

- a. utriculă;
- b. saculă;
- c. ampulele canalelor semicirculare;
- d. melcul membranos.
- e. melcul osos.

36. Celulele receptoare vestibulare:

- a. primesc la polul bazal terminații dendritice ale neuronilor din ganglionul Corti;
- b. prezintă cili la polul apical;
- c. sunt situate în macula uticulară;

- d. sunt situate în macula saculară;
- e. sunt situate în crestele ampulare.

37. Celulele receptoare vestibulare din maculă:

- a. prezintă la polul apical cili înglobați în cupulă;
- b. prezintă la polul bazal terminații dendritice ale neuronilor din ganglionul Scarpa;
- c. sunt situate deasupra celulelor de susținere;
- d. prezintă deasupra granule de carbonat de calciu și magneziu;
- e. sunt situate pe membrana bazilară.

38. Celulele receptoare vestibulare din crestele ampulare:

- a. sunt situate în ampulele canalelor semicirculare membranoase;
- b. prezintă la polul apical cili înglobați în cupulă;
- c. prezintă la polul bazal terminații dendritice ale neuronilor din ganglionul Scarpa;
- d. sunt situate pe membrana vestibulară Reissner;
- e. sunt situate în organul Corti.

39. Nervul cohlear:

- a. este format din prelungirile axonice ale neuronilor din ganglionul spiral;
- b. se îndreaptă spre nucleii cohleari bulbari;
- c. este format din axonii protoneuronului din ganglionul Corti;
- d. face sinapsă cu deutoneuronul în organul Corti;
- e. face parte din perechea a VIII-a de nervi cranieni;

40. Nervul vestibular:

- a. este format din prelungirile axonice ale neuronilor din ganglionul vestibular;
- b. se îndreaptă spre nucleii vestibulari bulbari;
- c. este format din axonii protoneuronului din ganglionul Scarpa;
- d. face sinapsă cu deutoneuronul în corpii geniculați mediali din metatalamus;
- e. face parte din perechea VIII de nervi cranieni;

41. De la nivelul deutoneuronului căii vestibulare pleaca fascicule catre:

- a. talamus;
- b. hipotalamus;
- c. cerebel;
- d. nucleii nervilor cranieni.
- e. măduva spinării.

42. Din nucleii vestibulari pleaca fasciculele:

- a. vestibulo-cerebelos (controleaza tonusul muscular);
- b. vestibulo-nuclear (controleaza miscarile globilor ocular, cu punct de plecare labirintic);
- c. vestibulo-spinal (controleaza echilibrul static);
- d. vestibulo-talamic;
- e. vestibulo-cerebelos (controleaza echilibrul dinamic).

43. Transmiterea sunetului până la organul Corti se face prin intermediul:

- a. lanțului de oscioare din urechea medie;
- b. otolitelor;
- c. timpanului;
- d. lanțului de oscioare din urechea internă
- e. helicotreimei..

44. Perilimfa este prezentă în:

- a. rampa timpanică;
- b. rampa vestibulară
- c. canalul cohlear;
- d. între labirintul osos și cel membranos;
- e. organul Corti.

45. Endolimfa este prezentă în următoarele structuri, cu Excepția:

- a. rampa timpanică;
- b. rampa vestibulară
- c. canalul cohlear;

- d. între labirintul osos și cel membranos;
- e. organul Corti.

46. Analizatorul vestibular informează creierul asupra:

- a. localizării sursei de zgomot;
- b. acclerării mișcărilor liniare;
- c. acclerării mișcărilor circulare;
- d. direcției undelor sonore;
- e. poziției capului în spațiu.

47. Reglarea echilibrului se face prin conlucrarea:

- a. analizatorului olfactiv;
- b. cerebelului;
- c. analizatorului tactil;
- d. analizatorului vizual;
- e. analizatorului kinestezic.

48. Receptorii maculari deserveșc:

- a. localizarea undelor sonore;
- b. echilibrul static;
- c. percepția biauriculară;
- d. accelerația liniară;
- e. reflexele statochinetic.

49. Receptorii maculari detectează:

- a. viteza de deplasare a corpului;
- b. accelerația liniară de deplasare;
- c. accelerația circulară de deplasare;
- d. poziția capului;
- e. viteza de deplasare a capului.

50. Crestele ampulare detectează:

- a. viteza de deplasare;
- b. accelerația circulară de deplasare;
- c. accelerația liniară de deplasare;
- d. mișcarea de rotație a capului;
- e. mișcarea de rotație a corpului.

51. Receptorii maculari:

- a. sunt stimulați mecanic de către otolite;
- b. sunt stimulați în condiții statice;
- c. sunt stimulați în condiții dinamice;
- d. sunt sediul unor reflexe posturale;
- e. sunt receptorii accelerațiilor circulare ale capului și corpului.

52. Ramura vestibulară a nervului cranian VIII face sinapsă în:

- a. nucleul vestibular superior din bulb;
- b. nucleul vestibular inferior din bulb;
- c. nucleul vestibular ventral din punte;
- d. nucleul vestibular lateral din punte;
- e. cei patru nucleii vestibulari din mezencefal.

53. Ramura cohleară ară a nervului cranian VIII face sinapsă în:

- a. nucleul cohlear superior din bulb;
- b. nucleul cohlear dorsal din punte;
- c. nucleul cohlear ventral din punte;
- d. nucleul vestibular lateral din bulb;
- e. cei doi nucleii cohleari din mezencefal.

54. Vestibulul membranos este format din:

- a. labirintul osos;
- b. utriculă;
- c. perilimfa;

- d. saculă;
- e. un sistem de camere membranoase.

55. Canalele semicirculare osoase:

- a. sunt în număr de trei;
- b. sunt perpendiculare unul pe celălalt;
- c. se deschid în vestibulul osos;
- d. se deschid în melcul osos;
- e. prezintă un ax central numit columelă.

56. Urechea internă cuprinde:

- a. labirintul osos;
- b. labirintul membranos;
- c. un sistem de camere situate în stânca temporalului ;
- d. un lanț articulat de trei oscioare;
- e. ciocanul, nicovala și scărița.

57. Rampa timpanică:

- a. este situată în melcul osos;
- b. comunică prin helicotrema cu rampa vestibulară;
- c. este situată sub membrane bazilară;
- d. conține endolimfă;
- e. comunică cu canalul cohlear.

58. Canalul cohlear:

- a. reprezintă melcul membranos;
- b. reprezintă melcul osos;
- c. conține organul Corti;
- d. conține endolimfă;
- e. se deschide în utriculă.

59. Utricula:

- a. face parte din vestibulul membranos;
- b. la nivelul ei se deschid canalele semicirculare membranoase;
- c. conține organul Corti;
- d. se află în urechea medie;
- e. comunică cu melcul osos.

60. Sacula:

- a. face parte din vestibulul membranos;
- b. este situată sub uticulă;
- c. din partea sa inferioară pornește canalul cohlear;
- d. conține endolimfă;
- e. este situată deasupra uticulei;

61. Protoneuronul căii auditive

- a. este situat în utriculă;
- b. este situat în saculă;
- c. este situat în ganglionul spiral Corti;
- d. axonii formează nervul cohlear;
- e. dendritele vin în contact cu celulele receptoare auditive.

62. Protoneuronul căii vestibulare:

- a. dendritele vin în contact cu celulele senzoriale din crestele ampulare;
- b. este situat în saculă;
- c. este situat în ganglionul vestibular Scarpa;
- d. axonii formează ramura vestibulară a nervului VIII;
- e. dendritele vin în contact cu celulele senzoriale din maculă.

63. Crestele ampulare:

- a. sunt situate în ampulele canalelor semicirculare membranoase;
- b. conțin celulele receptoare vestibulare;
- c. conțin celule de susținere ;

- d. conțin o cupolă gelatinoasă în care pătrund cilii celulelor receptoare;
- e. conțin celulele receptoare auditive.

64. Macula este situată în:

- a. ampulele canalelor semicirculare membranoase;
- b. saculă;
- c. canalul cohlear;
- d. utriculă;
- e. melcul membranos.

65. Macula este formată din:

- a. celule receptoare ciliate înglobate în membrana otolitică;
- b. o cupolă gelatinoasă;
- c. granule de carbonat de calciu și magneziu;
- d. celule de susținere așezate pe o membrană bazală.
- e. conține celule senzoriale auditive cu cilii;

66. Dendritele neuronilor din ganglionul vestibular Scarpa vin în contact cu:

- a. celulele senzoriale din macula utriculară;
- b. celulele senzoriale din macula saculară;
- c. celulele senzoriale din crestele ampulare;
- d. al doilea neuron al căii vestibulare;
- e. neuronii din nucleele vestibulare bulbari.